

COCCULINE®

MAL DES TRANSPORTS

FORMES ET PRÉSENTATIONS

Comprimés. Boîte de 30.

Dose de globules. Boîte de 6 doses.
Boîte de 3 doses.

COMPOSITION


Coccus	4 CH
Tabacum	4 CH
Nux vomica	4 CH
Petroleum	4 CH
aa, excipient q.s.p. 1 comprimé de 0,15 g ou 1 dose de globules de 1 g environ.		

INDICATIONS

Mal des transports : mal de mer,
mal de voiture, mal de l'air.

L'action de COCCULINE
est à la fois préventive et curative.

COCCULINE peut être administré aussi bien
aux enfants qu'aux adultes.



MAL DES TRANSPORTS

Effets secondaires, contre-indications : néant.
Précautions d'emploi, interactions médicamenteuses : néant.
Incidence sur vigilance et conduite : néant.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

Comprimés

- Préventif : 2 comprimés à sucer 3 fois par jour la veille du départ si possible et le jour du voyage.
- Curatif : 2 comprimés toutes les heures.

Doses

Une dose la veille du départ si possible, une 2^e dose juste avant le départ et une 3^e en cas d'apparition des symptômes du mal des transports.

Absorber par voie perlinguale (placer le contenu du tube dose sous la langue et laisser fondre).

Médicament autorisé.

Visa 214.411



Les Laboratoires Boiron participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non. Le dispositif mis en place par Cyclamed ne concerne que la France métropolitaine.

